

アタマジラミについて

マジラミは、学校や園、スイミングスクールなどの集団の中で、しばしば発生し、頭が触れ合ったり、物を介して感染します。
誰にでも起こりうるもので、清潔・不潔に関係ありません。

園での対応

- ・感染が確認されたお友だちは、ただちに同居ご家族と一緒に駆除をお願いします。
- ・感染が確認されたお友だちは、毎日帽子と午睡用タオルケットをお持ち帰り頂きます。
- ・プールは駆除完了まで入れません。（駆除開始確認してから10日後に検査）

駆除方法

- ・市販されているスミスリン入りのシャンプーが一般的で効果的です。

◎一人あたり1回量10～20ml使用し、3日に一度、連続して3～4回使用します。
（7日～10日間）→使用量、回数を正しくご使用下さい。
⇒同居している家族全員が駆除をおこないます。

- ・目の細かい櫛でのブラッシングなどで、卵を取り除きましょう。
- ・布団の日光消毒や、寝具カバーの洗濯、部屋の掃除を丁寧に行いましょう。
- ・心配な方は皮膚科でご相談下さい。

速やかに！家族一斉に！が大切です

予防方法

- ・シャンプーは毎日、大人が仕上げを行いましょう。
- ・アタマジラミは熱に弱いので、ドライヤーでよく乾かしたりブラッシングをしましょう。
- ・ご家庭でも頭髮点検を行いましょう。

見つけ方は？

成虫は1mm程で、肉眼でも確認出来ますが、動きが素早く髪の色に近いので、見つけるのは困難です。卵は0.5mm程で主に後頭部や耳の後ろ、生え際に多く発見され、しごかないと取れません。

ご家庭で発見された場合は

卵の形に特徴



※近年、「新型」と呼ばれる抵抗性のアタマジラミが増加しています。

スミスリン駆除薬が効かない「ピレスロイド耐性アタマジラミ」という種類も稀にあります。規定期間、薬を正しく使ったのに、頭をかいている、成虫や卵の増加が見られる等、駆除がうまくいかない様子がありましたら、薬を使い続けるのではなく、シラミ専用すき櫛を使った駆除に切り替えましょう。

*小学校等に通われてる兄弟に頭じらみが確認された場合ですが園に連絡が無いことがあります。兄弟が確認された場合高い確率で弟妹に認められます。園での広がりを防ぐため必ずお知らせください。